

Antibiotikët që nuk kanë efekte të dëmshme në fruta janë:

Cila është një simptomë karakteristike e endometriozës?

Cila është procedura e saktë terapeutike në një paciente femër 48-vjeçare me gjakderdhje të çrregullt:

Cila është simptoma kryesore e kancerit ovarian në fazën e hershme:

Cila është simptoma kryesore e një kist ovarian rrotullues:

Cila gjendje emergjente duhet të merret parasysh në prani të dhimbjes nga inflamacioni i adneksave:

Cila gjendje emergjente duhet të merret parasysh në prani të dhimbjes nga inflamacioni i adneksave:

Cila metodë diagnostike është përfundimtare në diagnostikimin e ndryshimeve premalinje të qafës së mitrës:

Cila nga metodat e mëposhtme nuk i përket metodave natyrale të kontracepsionit:

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk është karakteristike për menopauzën

Cilat ekzaminime të përgjithshme janë të nevojshme gjatë ekzaminimit të parë të shtatzënisë:

Cilën metodë diagnostike do të përdorni gjatë ekzaminimit të infertilitetit sekondar martesor, nëse pacienti ka pasur një lindje normale të mëparshme dhe burri ka një spermogram normal:

Cili hormon monitorohet në serum të pacientit pas gjendjes së molla hydatidosa të evakuuar:

Cili nga efektet anësore dhe komplikimet e mëposhtme nga përdorimi i një spirale intrauterine është më i rrallë:

Cili NUK është tregues për fekundim in vitro?

Dallimi i një strukture cistike nga një strukturë solide në gji bëhet më së miri nga:

Diagnoza prenatale nuk përfshin:

Faza luteale e ciklit menstrual shoqërohet me:

Gjakderdhja e parregullt, jociklike nga mitra me kohëzgjatje dhe intensitet të ndryshëm, pavarësisht nga cikli menstrual, është:

Gjakderdhja e zgjatur dhe/ose e shtuar nga uterus i që ndodh në intervale të rregullta është:

Gjakderdhja jofunksionale e uterinës NUK shoqërohet me:

Kandidiaza vaginale NUK karakterizohet nga:

Kardiotokografia nuk është e aplikueshme për:

Klimateriumi nuk është i lidhur me:

Kyretazhi fraksional eksplorues është i dobishëm për diagnostikimin e:

Laktacioni shoqërohet me:

Lindja në afat perkufizohet si lindje:

Ndryshimet normale endokrine në shtatzëni përfshijnë të gjitha sa vijon, PËRVEÇ:

Një shkak medikamentoz i kandidiazës vaginale është përdorimi i

Përrjashtoni një metodë që nuk është e nevojshme përpara se të vendosni të jepni terapi zëvendësuese hormonale:

Shfaqja e qimeve intensive të tipit mashkullor tek femrat është

Steriliteti primar është i zakonshëm tek të gjithë, përveç pacientëve me:

Tek një grua me lindje të dytë në javën e 32-të të shtatzënisë, me placentë previa, shtatzënia e mëparshme ka përfunduar me prerje cezariene, ajo ka gjakderdhje të rrallë, është kundërrindikuar dhënia e:

Treguesi më i zakonshëm për përfundimin e lindjes me një ekstraktor vakum është:

Vetëm një nga kushtet e mëposhtme nuk është shkaktar i gjakderdhjes në shtatzëninë e hershme: